

MRSA-Hygienemanagement

Pflegeplan immobiler Patient



Wer	Wann	Womit	Bitte beachten	Was	Wie
Pflegepersonal	Vor Betreten des Patientenzimmers	Sterillium® Sterillium® classic pure	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Basishygiene	<ul style="list-style-type: none"> Hygienische Händedesinfektion Mund-Nasenschutz anlegen Schutzkittel anlegen Einmalhandschuhe anziehen
Pflegepersonal	laut Anordnung			Abstriche	Erforderliche Abstriche entnehmen (mind. Nasenvorhöfe, Rachenraum, ggf. Wunden)
Pflegepersonal			Wunde wasserdicht abdecken	Ggf. Verbandwechsel	Bei stark sezernierenden Wunden vor der Ganzkörperwaschung
Pflegepersonal Patient	Täglich		Auf ausreichend Einmal-Zahnbürsten achten. Zahnputzbecher desinfizieren.	Mundpflege	Zähneputzen mit Einmalzahnbürste
Patient	Täglich über 5 Tage im Rahmen der Sanierung	Stellisept® med Stellisept® med foam Stellisept® med Tissues	Krankenhauswäsche im Wäschesack entsorgen Waschlotion auf den Waschlappen geben und sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 30 Sek. Einwirkzeit beachten. Anschließend mit feuchtem Tuch abwischen und mit trockenem Handtuch abtrocknen (nur Stellisept® med). Stellisept® med foam und Stellisept® med Tissues = „Leave-on“-Produkt Einmalwaschlappen verwenden (außer bei Stellisept® med Tissues)	Antiseptische Ganzkörperwaschung	Patienten entkleiden 1. Waschgang: <ul style="list-style-type: none"> Haare Kopf auf frisches Handtuch legen Stirn Gesicht Bei geschlossenen Augen von außen nach innen waschen <ul style="list-style-type: none"> Ohren Hals: Vorderseite und Seiten 2. Waschgang: <ul style="list-style-type: none"> Oberkörper vorn Obere Extremitäten Axillen Leisten Untere Extremitäten Vorderseite <ul style="list-style-type: none"> Genitalbereich Waschlappen entsorgen 3. Waschgang: Patienten auf die Seite lagern, frischen Waschlappen benutzen <ul style="list-style-type: none"> Hals: Nacken und Seiten Rücken Dem Personal zugewandte Flanke <ul style="list-style-type: none"> Untere Extremitäten Rückseite Analbereich Waschlappen entsorgen
Pflegepersonal	Täglich	Sterillium® Sterillium® classic pure	Nicht verwendete Bettwäsche im Zimmer belassen 30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Bettwäsche erneuern Teil I	<ul style="list-style-type: none"> Frisches Bettlaken ausbreiten, der Länge nach bis zur Mitte aufrollen und auf die Matratze legen Ggf. frisches Stecklaken ausbreiten, bis zur Mitte aufrollen, in Gesäßhöhe legen und einschlagen Patienten über den Wäschehügel auf die andere Seite legen Gebrauchte Bettwäsche sofort in den Wäschesack entsorgen Hygienische Händedesinfektion durchführen
Pflegepersonal	Täglich	Stellisept® med Stellisept® med foam Stellisept® med Tissues	30 Sek. Einwirkzeit beachten	Fortführung Ganzkörperwaschung	4. Waschgang: <ul style="list-style-type: none"> Einmalhandschuhe anziehen Frischer Waschlappen, Waschlotion/-schaum auf den Waschlappen geben und Flanke waschen Nach Einwirkzeit mit feuchtem Tuch abwischen und mit trockenem Handtuch trocknen
Reinigungs-personal	Täglich	Mikrobac® forte Kohrsolin® FF	5 ml/l - 0,5 % - 1 Std. 5 ml/l - 0,5 % - 1 Std.	Desinfektion vom patientennahen Umfeld und Fußboden	
Pflegepersonal	Täglich	Bacillol® AF, Sterillium® Sterillium® classic pure	Nicht verwendete Bettwäsche im Zimmer belassen (Konz. 30 Sek.) (30 Sek.) (30 Sek.)	Bettwäsche erneuern Teil II	<ul style="list-style-type: none"> Wischdesinfektion der Matratze Einmalhandschuhe ausziehen und entsorgen Hygienische Händedesinfektion Frisches Bett- und ggf. Stecklaken von der Bettmitte ausrollen, straffziehen und einspannen Kopfkissen beziehen und unter den Kopf des Patienten legen
Pflegepersonal	Täglich			Ggf. Hautpflege, frische Wäsche	
Personal	Täglich		Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion.	Ggf. Verbandwechsel	Bei trockenen, nicht infizierten Wunden nach der Ganzkörperwaschung
Personal	3 x täglich über 5 Tage im Rahmen der Sanierung	Mupirocin, ggf. Alternative bei Resistenz	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion.	Applikation von Nasensalbe	Streichholzkopfgröße Menge mit einem Wattetupfer in beide Nasenvorhöfe
Pflegepersonal	Vor Verlassen des Patientenzimmers	Sterillium® Sterillium® classic pure	30 Sek. Einwirkzeit beachten	Ausschleusen	<ul style="list-style-type: none"> Einmalhandschuhe ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Nasen-Mund-Schutz im Zimmer im Müll entsorgen Einweg-Schutzkittel ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Mehrweg-Schutzkittel im Zimmer belassen und bei Dienstende im Wäschesack entsorgen Hygienische Händedesinfektion durchführen



MRSA-Hygienemanagement

Pflegeplan mobiler Patient



Wer	Wann	Womit	Bitte beachten	Was	Wie
Pflegepersonal	Vor Betreten des Patientenzimmers	Sterillium® Sterillium® classic pure	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Basishygiene	<ul style="list-style-type: none"> Hygienische Händedesinfektion Mund-Nasenschutz anlegen Schutzkittel anlegen Einmalhandschuhe anziehen
Pflegepersonal	laut Anordnung			Abstriche	Erforderliche Abstriche entnehmen (mind. Nasenvorhöfe, Rachenraum, ggf. Wunden)
Pflegepersonal	Vor Betreten des Patientenzimmers	Wahlweise: Mikrobac® forte Kohrsolin® FF Bacillo® AF	Bettwäsche sofort im Wäschesack entsorgen 5,0 ml - 0,5 % - 1 Std. 5,0 ml - 0,5 % - 1 Std. Konz. - 30 Sek.	<ul style="list-style-type: none"> Bettwäsche erneuern Desinfektion des Matratzenbezuges Desinfektion von Mobiliar und Kontaktflächen 	<ul style="list-style-type: none"> Bett abziehen Wischdesinfektion <p>z. B. Tisch, Nachttisch, Bettgestell, Stuhlflächen, Griffe, Handläufe, Türklinken, Lichtschalter, Bettgalgen, Griffe, Klingelanlage</p>
Pflegepersonal Patient	Täglich	Bacillo® AF Sterillium® Sterillium® classic pure	Einmal-Materialien verwenden: z.B. Zahnbürste, Kamm, Nagelbürste etc. Wischdesinfektion auf alkoholverträgliche Materialien beschränken 30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Desinfektion persönlicher Gegenstände des Patienten Anschließend Einmalhandschuhe abwerfen und Händedesinfektion durchführen	<ul style="list-style-type: none"> Wischdesinfektion <p>z. B. Sehhilfen, Hörgerät, Schmuck, Thermometer, Haarbürste, Föhn,</p>
Pflegepersonal	Täglich		Nicht verwendete Bettwäsche im Zimmer belassen	Bett beziehen	
Reinigungspersonal	Täglich	Mikrobac® forte Kohrsolin® FF	5 ml/l - 0,5 % - 1 Std. 5 ml/l - 0,5 % - 1 Std.	Desinfektion vom patientennahen Umfeld und Fußboden	
Pflegepersonal	Wenn erforderlich		Wunde wasserdicht abdecken	Verbandwechsel	Bei stark sezernierenden Wunden vor der Ganzkörperwaschung
Patient	Täglich		Auf ausreichend Einmal-Zahnbürsten achten.	Mundpflege	Zähneputzen mit Einmalzahnbürste
Patient	Täglich über 5 Tage im Rahmen der Sanierung	Stellisept® med Stellisept® med foam Stellisept® med Tissues	Krankenhauswäsche im Wäschesack entsorgen Einmalwaschlappen verwenden (außer bei Stellisept® med Tissues) Einwirkzeit 30 Sekunden	Antiseptische Ganzkörperwaschung	<ul style="list-style-type: none"> Entkleiden Duschen: Haare und Körper anfeuchten, antiseptische Waschlotion auf Waschlappen geben (Dusche abstellen) <p>Reihenfolge der Waschung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stirn-Gesicht-Ohren-Hals Oberkörper-obere Extremitäten-Axillen Rücken (Mithilfe des Personals) Anal-Genitalbereich <ul style="list-style-type: none"> Neuen Waschlappen anfeuchten und mit antiseptischer Seife benetzen: Leiste-untere Extremitäten Nach Einwirkzeit Körper mit Wasser abdschen
Patient	Täglich			Ggf. Hautpflege, frische Wäsche anziehen	
Personal	Täglich			Verbandwechsel	Bei trockenen, nicht infizierten Wunden nach der Ganzkörperwaschung.
Personal	3 x täglich über 5 Tage im Rahmen der Sanierung	Mupirocin, ggf. Alternative bei Resistenz		Applikation von Nasensalbe	Streichholzkopfgröße Menge mit einem Wattestäbchen in beide Nasenvorhöfe
Pflegepersonal	Vor Verlassen des Patientenzimmers	Sterillium® Sterillium® classic pure	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Ausschleusen	<ul style="list-style-type: none"> Einmalhandschuhe ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Nasen-Mund-Schutz im Zimmer im Müll entsorgen Einweg-Schutzkittel ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Mehrweg-Schutzkittel im Zimmer belassen und bei Dienstende im Wäschesack entsorgen. Bei sichtbarer Verschmutzung sofort entsorgen. Hygienische Händedesinfektion durchführen

